



**Renfrew County and  
District Health Unit**

## **FICHE D'INFORMATION**

---

# **VACCIN CONTRE LE VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN**

---

### **ÉLÈVES DE 7<sup>IÈME</sup> ANNÉE**



Le vaccin VPH-9 est offert à tous les élèves de 7<sup>ième</sup> année dans le cadre du programme de vaccination financée par le secteur public. Le vaccin VPH-9 protège ces étudiants contre neuf types de virus du papillome humain (VPH).

### **Qu'est-ce que cela veut dire pour ma famille?**

Si vous avez un garçon ou une fille en 7<sup>ième</sup> année, il ou elle sera offert le vaccin à l'école par une infirmière de votre bureau de santé publique. Pour la plupart des étudiants, le vaccin est donné en série de 2 doses avec 6 mois d'intervalle. Les personnes à risques élevés devront suivre des recommandations différentes selon le calendrier.

### **Qu'est-ce que le VPH?**

Le VPH, Virus du Papillome Humain, est un virus très courant et grandement répandu dans le monde entier. Il existe plusieurs types de VPH et la plupart des personnes infectées du VPH ne développent pas de signes ou de symptômes. Certains types peuvent être à l'origine du cancer du col de l'utérus chez les femmes, du cancer du pénis chez les hommes, ainsi que certains cancers de la tête et du cou présents chez les hommes et les femmes. D'autres types de VPH peuvent causer la formation de lésions de la peau, comme des verrues génitales.

Il est estimé que sans la vaccination, 3 sur 4 des Canadiens qui sont actifs sexuellement contracteront le VPH pendant leur vie. Heureusement, nous pouvons prévenir les infections les plus courantes du VPH par la vaccination.

### **Quand est-ce que mon enfant devrait recevoir le vaccin contre le VPH?**

Le vaccin contre le VPH est recommandé pour les garçons et les filles en début d'adolescence de façon à ce qu'ils soient protégés contre les infections causées par le VPH pouvant entraîner le cancer. Il est important de faire vacciner votre garçon ou votre fille avant qu'ils ne deviennent actifs sexuellement et donc potentiellement exposés au VPH.

**Visitez notre site web au [www.rcdhu.com](http://www.rcdhu.com)**

"Optimal Health for All in Renfrew County and District"

## Comment le vaccin fonctionne-t-il?

Le vaccin contient neuf types de VPH et donc assure une protection contre ceux-ci. Ces neuf types de VPH causent 70 pourcent des cancers du col de l'utérus, des parties génitales et de l'anus ainsi que 90 pourcent des verrues génitales. Ce vaccin agit le plus efficacement lorsque les personnes sont vaccinées avant de devenir sexuellement actives. Cependant, le vaccin est aussi recommandé pour les personnes qui sont déjà sexuellement actives. Cela s'explique par le fait qu'elles n'ont peut-être pas été infectées par le VPH au cours d'activités sexuelles antérieures, et risquent peu d'être infectées par les types de VPH présents dans le vaccin.

## Est-ce que le vaccin est sécuritaire?

Le vaccin contre le VPH est très sécuritaire et efficace. Il a été vérifié soigneusement et a été approuvé par Santé Canada. Le vaccin contre le VPH a été approuvé pour usage dans plus de 100 pays et plus de 175 millions de doses ont déjà été administrées dans le monde entier.

La plupart des gens n'ont aucuns effets secondaires. Toutefois, comme pour tous les vaccins, il peut en provoquer, dont les plus courants sont bénins. Ils comprennent la douleur au bras, l'enflure ou l'apparition d'une rougeur au point d'injection. Les autres effets secondaires signalés sont les étourdissements, les nausées, les maux de tête, la fièvre et les évanouissements.

## À quel moment devrais-je contacter mon médecin/infirmière praticienne?

Consultez votre médecin/infirmière praticienne ou rendez-vous dans un centre hospitalier le plus près de chez vous si l'un de ces symptômes se développe dans les trois jours suivants la vaccination:

- urticaire (éruption cutanée)
- enflure au niveau du visage et de la bouche
- difficultés respiratoires
- somnolence importante, pâleur
- fièvre élevée (40°C ou 104°F et plus)
- convulsions

## Qui ne devrait pas recevoir le vaccin ?

Votre enfant ne devrait pas recevoir le vaccin contre le VPH si:

- il a déjà été immunisé adéquatement
- a fait une réaction allergique sévère à une dose précédente du vaccin
- a une allergie à toutes autres composantes du vaccin contre le VPH (ex : alluminium, chlorure de sodium, L-histidine, borate de sodium, polysorbate 80)

**Vous devriez toujours discuter des bienfaits et des risques de n'importe quel vaccin avec votre médecin/infirmière praticienne ou téléphoner le bureau de santé publique.**

## À qui dois-je m'adresser si j'ai des questions?

Consultez votre médecin/infirmière praticienne ou appelez la ligne Info santé du bureau de santé publique au 613-735-8666 ou sans frais au 1-800-267-1097, poste 666.

## Comment tenir à jour son dossier de vaccination ?

Après avoir reçu un vaccin, assurez-vous que votre carnet de vaccination est à jour. N'oubliez pas de le conserver dans un endroit sûr !

Pour nous joindre ou pour plus d'information :	
	613-735-8653 ou 1-800-267-1097
	<a href="http://www.rcdhu.com">www.rcdhu.com</a> Healthy Living Immunization Grade 7 Immunizations
	7 International Dr, Pembroke, ON K8A 6W5
	 @RCDHealthunit

Source : Ministère de la santé et des soins de longue durée (2017), Guide canadien d'immunisation (2016)

Visitez notre site web au [www.rcdhu.com](http://www.rcdhu.com)