

RENFREW COUNTY AND DISTRICT HEALTH UNIT

Questions Fréquemment Posées (QFP): Vaccin contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans

1. Quel vaccin les enfants de 5 à 11 ans recevront-ils ?

Santé Canada a autorisé l'utilisation du vaccin ARNm Pfizer-BioNTech Comirnaty contre la COVID-19 conçu pour les enfants de 5 à 11 ans.

2. Les enfants âgés de 5 à 11 ans recevront-ils la même dose que les adolescents ou les adultes ?

Non. Le vaccin Pfizer Comirnaty pour les enfants est une dose plus faible. Le vaccin utilisé pour les enfants de 5 à 11 ans contient 10 microgrammes d'ARNm, tandis que le vaccin utilisé pour les adolescents et les adultes contient 30 microgrammes d'ARNm. Cela s'explique par le fait que le système immunitaire des enfants est plus fort que celui des jeunes et des adultes.

3. Les enfants qui pèsent plus ou qui ont presque 12 ans devraient-ils avoir une dose adulte ?

Non. Les enfants qui pèsent plus ou qui ont presque 12 ans n'ont pas besoin de doses plus importantes du vaccin. La dose du vaccin contre la COVID-19 ne varie pas en fonction du poids du patient mais en fonction de son âge le jour de la vaccination.

4. Combien de doses du vaccin contre la COVID-19 les enfants recevront-ils ?

Le Comité consultatif national de l'immunisation recommande qu'une série complète du vaccin Pfizer-BioNTech Comirnaty contre la COVID-19 (10mcg) soit offerte aux enfants au moins 8 semaines entre la première et la deuxième dose. Pour le moment, il n'y a pas de recommandations au sujet d'une troisième dose ou d'une dose de rappel.

5. Que contient le vaccin Pfizer Comirnaty contre la COVID-19 ?

Le vaccin Pfizer Comirnaty contient de l'ARNm. L'ARNm demande à vos cellules de fabriquer la protéine de spicule COVID-19. Les sucres et les sels sont légèrement différents dans le vaccin pour les enfants, le vaccin peut donc être conservé plus longtemps au réfrigérateur. Le vaccin ne contient pas de virus vivant. Votre enfant ne peut pas contracter la COVID-19 à cause du vaccin.



RENFREW COUNTY AND DISTRICT HEALTH UNIT

Questions Fréquemment Posées (QFP): Vaccin contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans

6. Les vaccins contre la COVID-19 ARNm fonctionnent-ils pour les enfants âgés de 5 à 11 ans ?

Oui. Lors des essais cliniques les enfants ont démontré une forte réponse immunitaire au vaccin Pfizer Comirnaty. Les enfants ayant reçu 2 doses du vaccin Pfizer Comirnaty contre la COVID-19 avaient 91 % moins de chances de contracter la COVID-19. Le vaccin Pfizer Comirnaty offre une protection contre la variante Delta.

7. Quels sont les effets secondaires normaux auxquels on peut s'attendre après avoir reçu le vaccin?

Les effets secondaires normaux après l'administration du vaccin contre la COVID-19 s'agit d'une douleur et une enflure au site d'administration du vaccin, de la fatigue, des douleurs musculaires ou des maux de tête. De nombreux enfants participant aux essais cliniques ont eu des effets secondaires bénins après avoir reçu le vaccin Pfizer Comirnaty. Ces effets secondaires devraient disparaître après quelques jours.

8. Quels sont les effets secondaires graves des vaccins à ARNm COVID-19 chez les enfants ?

Aucun nouvel effet secondaire grave n'a été observé dans les essais cliniques du vaccin Pfizer Comirnaty contre la COVID-19 pour les enfants. Les effets secondaires graves, comme l'anaphylaxie (une allergie grave), après les vaccins à ARNm COVID-19 sont rares. Les enfants allergiques aux aliments, aux médicaments, aux ficelles d'insectes ou à d'autres vaccins peuvent recevoir en toute sécurité des vaccins à ARNm contre la COVID-19. L'inflammation du cœur (myocardite) et l'inflammation du sac autour du cœur (péricardite) peuvent survenir rarement. Ces conditions sont plus fréquentes chez les jeunes hommes et suivant la deuxième dose. Elles sont généralement bénignes et sont traitées avec du repos et des médicaments.


9. Quels sont les symptômes de la myocardite et de la péricardite ?

Les symptômes peuvent inclure des douleurs thoraciques (les plus courantes), une sensation d'essoufflement et des arythmie cardiaques. Lorsque ces conditions surviennent après un vaccin contre la COVID-19, les symptômes commencent généralement au cours des 7 premiers jours.

10. Comment puis-je soutenir un enfant anxieux à propos des vaccins ?

Le système CARD (Confort, Aide, Relaxation, Distraction) peut aider. Pour plus de renseignement S.V.P visiter le lien suivant;

https://www.health.gov.on.ca/fr/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/CARD_Vaccination_Handout.pdf



RENFREW COUNTY AND DISTRICT HEALTH UNIT

Questions Fréquemment Posées (QFP): Vaccin contre la COVID-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans

11. Comment puis-je soutenir un enfant qui a une déficience, des limitations ou des besoins spécifiques ?

Certains enfants auront besoin de plus de soutien pour accéder aux vaccins COVID-19. Les enfants et leurs tuteurs peuvent parler avec leur fournisseur de soins de santé pour élaborer un plan qui correspond à celui de l'enfant (c.-à-d. un rendez-vous plus long, un espace calme).

12. Où puis-je trouver plus d'informations sur les vaccins contre la COVID-19 ?

- **Gouvernement du Canada – Recommandations sur l'utilisation du vaccin Pfizer BioNTech Comirnaty COVID-19 (10 mcg) chez les enfants de 5 à 11 ans -**
- <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/comite-consultatif-national-immunisation-ccni/recommandations-utilisation-vaccins-covid-19/pfizer-biontech-10-mcg-enfants-ages-5-11-ans.html>
- **Government of Canada – Pfizer-BioNTech Comirnaty COVID-19 vaccine: What you should know -**
<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html>
- **Ontario Government - COVID-19 vaccines for Ontario -** <https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario>
- **Ministry of Health and Long-term Care -** [COVID-19 Vaccine-Relevant Information and Planning Resources](#)