



FICHE D'INFORMATION

AFLURIA^{MD} TETRA (Vaccins quadrivalents inactivés)

Les personnes âgées ≥ 5 ans

C'est quoi le vaccin quadrivalent inactivé? (VQI)

Le VQI est un vaccin qui est administré par injection intramusculaire pour aider à protéger contre la grippe. Ce vaccin est financé par les fonds publics et sont offerts aux personnes âgées ≥ 5 ans.

Le VQI est un vaccin comprenant quatre composantes qui protègent contre deux souches de grippe A et deux souches de grippe B.

Quels sont les risques associés au VQI?

Le vaccin antigrippal, tout comme n'importe quel médicament, peut causer des effets secondaires qui, dans la plupart des cas, sont bénins et ne durent que quelques jours. Les effets secondaires les plus courants du vaccin antigrippal sont les suivants : rougeur, enflure et douleur au point d'injection, mal de tête, fatigue/faiblesse, fièvre.

Le vaccin antigrippal peut-il être administré aux personnes malades?

Cela dépend de la gravité des symptômes. Les personnes souffrant d'une maladie aiguë grave avec ou sans fièvre doivent attendre que les symptômes diminuent avant d'être vaccinées. Les personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire aiguë, y compris des symptômes mineurs comme un mal de gorge, de se soumettre à une auto-évaluation de la COVID-19 (disponible à l'adresse [auto-évaluation - nouveau coronavirus \(COVID-19\) \(ontario.ca\)](https://www.ontario.ca/fr/actualites/2020/09/2020-09-10-19-covid-19-évaluation)). Si la personne obtient un résultat négatif en utilisant l'outil d'auto-évaluation, elle peut être vaccinée contre la grippe.

Qui ne doit PAS recevoir le vaccin antigrippal?

Les personnes suivantes ne devraient pas recevoir le vaccin :

- Toute personne ayant eu une réaction allergique grave (anaphylaxie) à une dose précédente du vaccin antigrippal ou à une composante du vaccin ne devrait pas être vaccinée.
- Les personnes allergiques aux œufs peuvent recevoir le vaccin antigrippal. Pour ces individus, nous vous demandons de prendre contact avec votre fournisseur de soins de santé, car RCDHU n'administre pas le vaccin aux individus ayant une allergie anaphylactique aux œufs
- Toute personne qui a développé le syndrome de Guillain-Barré (SGB) dans les six semaines suivant une vaccination contre la grippe ne devrait généralement PAS être vaccinée; TOUTEFOIS, il faut évaluer les risques de non-protection contre la grippe.

Combien de doses du vaccin contre la grippe sont nécessaires pour fournir une protection?

Les enfants de 6 mois à moins de 9 ans qui n'ont jamais reçu un vaccin antigrippal devraient recevoir 2 doses à un intervalle minimum de 4 semaines. Les enfants de 6 mois à moins de 9 ans qui ont déjà reçu au moins une dose de vaccin antigrippal ou les enfants âgés 9 ans et plus ont seulement besoin de recevoir une dose du vaccin antigrippal.

Continuer au verso

Le VQI offre-t-il une protection contre la COVID-19?

Le vaccin antigrippal ne protégera pas contre les virus des voies respiratoires autres que la grippe, y compris le coronavirus qui cause la COVID-19, mais il aidera à prévenir l'infection et la maladie causées par le virus de la grippe.

Le vaccin antigrippal augmentera-t-il le risque d'infection ou de conséquences graves liées à la COVID-19?

Les groupes d'experts et les données probantes indiquent que l'administration du vaccin antigrippal n'augmentera pas le risque d'infection à la COVID-19 ou de conséquences graves liées à la COVID-19.

Le vaccin antigrippal peut-il être administré en même temps que d'autres vaccins?

Le vaccin antigrippal VQI peuvent être administré en même temps que d'autres vaccins, ou en tout temps avant ou après d'autres vaccins, y compris les vaccins contre la COVID-19 pour les personnes de 5 ans et plus seulement.

Les VQI peuvent-ils causer la grippe?

Les VQI sont des vaccins inactivés, de sorte que les personnes ne peuvent pas contracter la grippe en raison du vaccin.

Quand dois-je contacter mon fournisseur de soins de santé?

Appelez votre fournisseur de soins de santé ou se rendre au service d'urgence le plus proche en cas de réactions graves, notamment les suivantes :

- Urticaire
- Enflure de la bouche ou de la gorge
- Difficulté à respirer, enrouement ou respiration sifflante
- Forte fièvre (plus de 40 °C ou 104 °F)
- Convulsions (crises d'épilepsie)
- Autres réactions graves

À qui dois-je m'adresser si j'ai des questions ?

Consultez votre fournisseur de soins de santé ou appelez-nous : **613-732-9436** ou **1-833-773-0004**.

Comment tenir à jour son dossier de vaccination?

Après avoir reçu un vaccin, assurez-vous qu'il est inscrit dans votre carnet "livret jaune".

Pour nous joindre ou pour plus d'information :



613-732-9436 ou 1-833-773-0004



www.rcdhu.com

Healthy Living

Immunization

Immunizations for Children



141 Lake Street, Pembroke, ON, K8A 5L8



@RCDHealthunit

Référence: Adapté à partir de la fiche de renseignements du ministère de la Santé

2022/2023 FAQ à l'intention des fournisseurs de soins de santé : Renseignements sur la vaccination contre la grippe pour les personnes âgées de 6 mois à 64 ans. Septembre 2022.

FAQ à l'intention des fournisseurs de soins de santé : Renseignements pour la saison grippale 2022-2023. Septembre 2022.

Visitez notre site web au www.rcdhu.com