



C'est quoi le vaccin quadrivalent inactivé Haute dose? (VQI-HD)

Le VQI-HD est un vaccin compris de quatre composantes qui protègent contre deux souches de grippe A et deux souches de grippe B.

Qu'est-ce que le VQI-HD et en quoi est-il différent du VQI?

Le VQI-HD et le VQI contiennent tous deux quatre souches de grippe, mais le VQI-HD contient une plus grande quantité d'antigènes par souche que les formulations de vaccin antigrippal à dose standard. Des études ont montré que la teneur plus élevée en antigène du vaccin à haute dose améliore la réponse immunitaire et la prévention des hospitalisations dues à la grippe par rapport au vaccin à dose standard, ce qui est important puisque les personnes plus âgées peuvent ne pas répondre aussi bien aux vaccins contre la grippe que les personnes plus jeunes.

Quel vaccin contre la grippe devrait-je recevoir?

Le VQI et le VQI-HD protègent tous deux contre la grippe, et le plus important est que les personnes âgées soient vaccinées. Ne retardez pas la vaccination pour attendre un produit en particulier. Lorsqu'il est disponible, le VQI-HD devrait être utilisé plutôt que le vaccin à dose standard, compte tenu du fardeau de la grippe et des preuves solides d'une meilleure protection par rapport à la dose standard chez les adultes de 65 ans et plus. Il n'existe aucune recommandation préférentielle pour l'utilisation du vaccin QIV-HD par rapport au vaccin TIV-adj pour les adultes de plus de 65 ans.

Quels sont les risques associés au VQI-HD?

Le vaccin antigrippal, tout comme n'importe quel médicament, peut causer des effets secondaires qui, dans la plupart des cas, sont bénins et ne durent que quelques jours. Les effets secondaires les plus courants du vaccin antigrippal sont les suivants : rougeur, enflure et douleur au point d'injection, mal de tête, fatigue/faiblesse, fièvre.

Le vaccin antigrippal peut-il être administré aux personnes malades?

Cela dépend de la gravité des symptômes. Les personnes souffrant d'une maladie aiguë gravent avec ou sans fièvre doivent attendre que les symptômes diminuent avant d'être vaccinées. Il faut recommander aux personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire aiguë, y compris des symptômes mineurs comme un mal de gorge, de se soumettre à une auto-évaluation de la COVID-19 (disponible à l'adresse [auto-évaluation - nouveau coronavirus \(COVID-19\) \(ontario.ca\)](https://www.ontario.ca/fr/actualites/2020/09/2020-09-16-01)). Si la personne obtient un résultat négatif en utilisant l'outil d'auto-évaluation, elle peut être vaccinée contre la grippe.



Qui ne doit pas recevoir le vaccin antigrippal?

Les personnes suivantes ne devraient pas recevoir le vaccin : Toute personne ayant eu une réaction allergique grave (anaphylaxie) à une dose précédente du vaccin antigrippal ou à toute composante du vaccin ne devrait pas être vaccinée. Toute personne qui a développé le syndrome de Guillain-Barré (SGB) dans les six semaines suivant une vaccination contre la grippe devrait généralement ne PAS être vaccinée; TOUTEFOIS, il faut évaluer les risques de non-protection contre la grippe.

Le VQI-HD offre-t-il une protection contre la COVID-19?

Le vaccin antigrippal ne protégera pas contre les virus des voies respiratoires autres que la grippe, y compris le coronavirus qui cause la COVID-19, mais il aidera à prévenir l'infection et la maladie causées par le virus de la grippe.

Le vaccin antigrippal peut-il être administré en même temps que d'autres vaccins?

Les vaccins antigrippaux VQI peuvent être administrés en même temps que d'autres vaccins, ou en tout temps avant ou après d'autres vaccins, y compris les vaccins contre la COVID-19.

Les VQI-HD peuvent-ils causer la grippe?

Vous ne pouvez contracter la grippe à cause du vaccin ; cependant, il faut 2-3 semaines à votre corps pour produire des anticorps suite au vaccin. Si vous êtes exposé au virus immédiatement avant ou après la vaccination, vous pourriez quand même développer des symptômes.

Quand dois-je appeler mon fournisseur de soins de santé?

Appeler votre fournisseur de soins de santé ou rendre au service d'urgence le plus proche en cas de réactions graves, notamment les suivantes :

- Urticaire
- Enflure de la bouche ou de la gorge
- Forte fièvre (plus de 40 °C ou 104 °F)
- Difficulté à respirer, enrouement ou respiration sifflante
- Convulsions (crises d'épilepsie)
- Autres réactions graves

À qui dois-je m'adresser si j'ai des questions ?

Consultez votre fournisseur de soins de santé ou appelez-nous : 613-732-9436 ou 1-833-773-0004.

Référence: Adapté à partir de la fiche de renseignements du ministère de la Santé et des Soins de longue durée 2023/2024 FAQ à l'intention des fournisseurs de soins de santé, Septembre 2023. FAQ à l'intention des fournisseurs de soins de santé : Renseignements pour la saison grippale 2023-2024. Septembre 2023.